

Zeckenzyklus: 3 Stadien – 3 Blutmahlzeiten



Präventions-App Zecke: Android (ab Version 4.0): <http://play.google.com/store/apps/details?id=com.garzotto.zecke>
Apple iOS (ab Version 7.1) <http://appstore.com/apps/Zecke>



1 vollgesogenes Zeckenweibchen, 2000 bis 3000 Eier

	Stadium	Grösse, Farbe	Vorkommen Wahrscheinlichkeit	Wirte	Krankheitserreger	Grössenvergleich
1	Larve	< 0.5mm, transparent	am Boden, hunderte beim Gelege	Mäuse, Vögel kleine Wirbeltiere	nur in Spezialfällen infiziert, läßt sich am Wirt auf	 1mm
2	Nymphe	ca. 1mm, schwarz Hinterleib transparent	Bodennähe, < 50cm verbreitet, viele	mittelgrosse Wirbeltiere, Menschen	FSME, Borreliose, Babesiose, Q-Fieber,...	
3	Adulte	1.5 mm ♂ < 3.5 mm ♀ schwarz Hinterleib	Krautschicht, < 1m lokal, einzelne	grosse Wirbeltiere, Haustiere, Menschen	FSME, Borreliose, Babesiose, Q-Fieber,...	

Legende:

-  Zecke ohne Krankheitserreger
-  mit Krankheitserreger infizierte Zecke

Ø Vorkommen von Krankheitserregern in Zecken

Borreliose Bakterium, 1% – über 50%



FSME-Virus, lokal gehäuft bis 1%

